

CENTRIX DENTAL - ACCESS Flow

Wskazania do stosowania:

Pasta służy do retrakcji dziąsła bez konieczności użycia nici retrakcyjnej. Poza tym można zastosować jako uzupełnienie do nici w przypadku „grubych” dziąseł. Ściągające działanie chlorku glinu i glinika kaolinowa zatrzymuje krwawienie i reguluje poziom płynu w rowku dziąsłowym.

Sposób użycia:

1. Przygotowanie zęba do odbudowy.
2. Wyjmij AccessFlow z opakowania foliowego i wstawić do dowolnego Centrix C-R® strzykawka. Zdjąć nasadkę
3. Powoli wstrzyknąć Access Flow do kieszonki powstałej po oszlifowaniu zęba.
4. Pozostawić na miejscu przez co najmniej 2 minuty.

5. Dokładnie spłukać i wysuszyć strony. Ważne jest, aby usunąć pastę całkowicie z kieszonki, pozostałość może zaszkodzić dokładnemu wyciskowi lub zakłócić cyfrowe przetwarzanie obrazu. Powtórzyć w razie potrzeby.

6. Zrób wycisk za pomocą materiału/masy wyciskowej.

Pasta zawiera około 15% chlorku glinu wraz z gliniką kaolinową.

Nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na chlorek glinu. W razie, gdy preparat dostanie się do oczu, przemyć dużą ilością wody.

CENTRIX DENTAL - ACCESS Flow

Wskazania do stosowania:

Pasta służy do retrakcji dziąsła bez konieczności użycia nici retrakcyjnej. Poza tym można zastosować jako uzupełnienie do nici w przypadku „grubych” dziąseł. Ściągające działanie chlorku glinu i glinika kaolinowa zatrzymuje krwawienie i reguluje poziom płynu w rowku dziąsłowym.

Sposób użycia:

1. Przygotowanie zęba do odbudowy.
2. Wyjmij AccessFlow z opakowania foliowego i wstawić do dowolnego Centrix C-R® strzykawka. Zdjąć nasadkę
3. Powoli wstrzyknąć Access Flow do kieszonki powstałej po oszlifowaniu zęba.
4. Pozostawić na miejscu przez co najmniej 2 minuty.

5. Dokładnie spłukać i wysuszyć strony. Ważne jest, aby usunąć pastę całkowicie z kieszonki, pozostałość może zaszkodzić dokładnemu wyciskowi lub zakłócić cyfrowe przetwarzanie obrazu. Powtórzyć w razie potrzeby.

6. Zrób wycisk za pomocą materiału/masy wyciskowej.

Pasta zawiera około 15% chlorku glinu wraz z gliniką kaolinową.

Nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na chlorek glinu. W razie, gdy preparat dostanie się do oczu, przemyć dużą ilością wody.

centrix